

### CUESTIONARIO NUMERO 35

#### PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEMA:

#### ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL RECIÉN NACIDO POR DEFICIENCIA DE VITAMINA K

1. **La enfermedad hemorrágica del recién nacido por deficiencia de vitamina K es causada por:**
  - a. Tener ausencia de reservas tisulares de vitamina K
  - b. Ausencia de profilaxis con la administración de vitamina K al nacer
  - c. Lactancia materna exclusiva
  - d. Inicio tardío de la alimentación
  - e. Todas las anteriores
  
2. **La vitamina K se encuentra disponible en dos formas:**
  - a. Fitoquinona o vitamina K1
  - b. Vitamina K2 o menaquinona
  - c. a y b
  - d. Vitamina K3 o meroquinona
  - e. Ninguna de las anteriores
  
3. **La vitamina K se encuentra en las siguientes concentraciones:**
  - a. 15  $\mu\text{g/L}$  en la leche materna
  - b. 60  $\mu\text{g/L}$  en la leche de vaca
  - c. 90  $\mu\text{g/L}$  en la leche de materna
  - d. 30  $\mu\text{g/L}$  en la leche de vaca
  - e. a y b
  
4. **El sangrado más peligroso y que deja secuelas severas o es la causa de muerte, es:**
  - a. Hemorragia digestiva
  - b. Hemorragia intracraneana
  - c. Hemorragia pulmonar
  - d. Hemorragia renal
  - e. Ninguna de las anteriores
  
5. **La anomalía primaria en la enfermedad hemorrágica del recién nacido por deficiencia de vitamina K es:**
  - a. Hipoprotrombinemia
  - b. Tiempo de sangría
  - c. Trombocitopenia
  - d. Hipofibrinogenemia
  - e. Ninguna de las anteriores

## Respuestas Cuestionario # 35

Respuestas:

1. e
2. c
3. e
4. b
5. a