

## EDUCACION CONTINUA EN PEDIATRIA

### CUESTIONARIO NUMERO 44

#### PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEMA: MANEJO DEL TRAUMA EN PEDIATRÍA

Responde verdadero o falso en las siguientes aseveraciones:

1. La sospecha de trauma en pediatría debe realizarse en todo paciente que tenga fiebre, hipotensión, dificultad respiratoria, alteración de la conciencia (Glasgow <13), dos o más fracturas de huesos largos, heridas penetrantes, quemaduras, amputaciones o parálisis de cualquier extremidad.

**V**

**F**

2. El 50% de los pacientes pediátricos politraumatizados tienen traumatismo cráneo encefálico.

**V**

**F**

3. Instalar cuatro vías venosas periféricas con un máximo de tres intentos o realizar osteoclisis en tibia proximal (<8 años) y distal (>8 años). No en extremidades fracturadas.

**V**

**F**

4. Pacientes con Glasgow < 10, signos de focalización, TCE abierto o fractura de cráneo debe ser trasladado a establecimientos con capacidad de TAC y neurocirugía.

**V**

**F**

## Respuestas Cuestionario # 44

Respuestas:

1. F
2. V
3. F
4. F