

CUESTIONARIO NUMERO 46

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEMA: CRIPTORQUIDIA

- 1. La criptorquidia es menos frecuente en:**
 - A. Recién nacido pre término
 - B. Recién nacido post-maduro
 - C. Recién nacido de bajo peso
 - D. Recién nacido de talla baja
 - e. Recien nacido gemelar

- 2. El tratamiento recomendado de la criptorquidia, incluye:**
 - A. Administración hormonal de gonadotrofinas y orquiopexia a los 6 años de edad
 - B. Corrección quirúrgica entre los 3- 6 meses de vida
 - C. Corrección quirúrgica a los 3 años de edad
 - D. Corrección quirúrgica entre los 6 a 12 meses de vida
 - E. Administración hormonal a los 6 meses y luego cada 6 meses por dos años

- 3. En todo caso de criptorquidia se debe solicitar:**
 - A. Ecografia abdomino-pelviana
 - B. Niveles séricos de testosterona
 - C. Laparoscopia diagnostica
 - D. Biopsia testicular
 - E. Todas son incorrectas

- 4. La complicación menos frecuente es:**
 - A. Oligoespermia
 - B. Infertilidad
 - C. Tumor testicular
 - D. Torsión testicular
 - E. Impotencia

- 5. En criptorquidia unilateral:**
 - A. Es frecuente cambios histológicos en el testículo contralateral
 - B. Es infrecuente cambios histológicos en el testículo contralateral
 - C. No existen cambios histológicos
 - D. Son correctas b) y c)
 - E. Ninguna es correcta

Respuestas
Cuestionario # 46

- 1. b**
- 2. d**
- 3. e**
- 4. e**
- 5. a**