

CUESTIONARIO NÚMERO 50

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEMA: DIABETES MELLITUS EN PEDIATRÍA

1. Diagnóstico de diabetes mellitus:

- a. Glucemia - 2 horas P.T.O.G. \geq 200 mg/dL (11.1 mmol/L).
- b. HbA1c (hemoglobina glucosilada) \geq 6.5 %.
- c. Glucemia basal \geq 126 mg/dL (7.0 mmol/L).
- d. Todas las opciones son correctas.
- e. Ninguna opción es correcta.

2. Síntomas de diabetes mellitus:

- a. Poliuria.
- b. Nicturia.
- c. Polidipsia.
- d. Todas las opciones son correctas.
- e. Ninguna opción es correcta.

3. Diagnóstico de cetoacidosis diabética:

- a. Bicarbonato $<$ 18 mmol/L
- b. pH $<$ 7.3
- c. Glucemia $>$ 250 mg/dL
- d. Todas las opciones son correctas.
- e. Ninguna opción es correcta.

4. Son análogos de insulina, de acción rápida:

- a. Glulisina.
- b. Aspartato.
- c. Lispro.
- d. Todas las opciones son correctas.
- e. Ninguna opción es correcta.

5. Control óptimo de la diabetes:

- a. HbA1c < 5 %.
- b. HbA1c <6.5 %.
- c. HbA1c <8.5 %.
- d. HbA1c <11 %.
- e. Ninguna opción es correcta.

**Respuestas
Cuestionario # 50**

Respuestas:

- 1. d
- 2. d
- 3. d
- 4. d
- 5. b