

CUESTIONARIO NÚMERO 51

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEMA: VACUNAS CONTRA EL PAPILOMA VIRUS HUMANO

1.- Cuando debe realizar una mujer la prevención del cáncer de cuello uterino?

- a) Al inicio de sus relaciones sexuales
- b) 3 años después de iniciar su vida sexual
- c) Solo con la vacuna contra el HPV a los 11 años.
- d) A sus 21 años
- e) b y c

2.- Necesitan hacerse todavía pruebas de Papanicolaou las mujeres que se hayan vacunado?

- a) No, la vacuna es suficiente
- b) Si, en la actualidad no hay cobertura total por la vacuna
- c) Solo las no vacunadas requieren
- d) Solo las no vacunada o las que no cumplieron con el esquema.
- e) Solo si se les identifica infección por HPV

3.- Cual es el esquema de prevención con el test de Papanicolaou?

- a) Una prueba de PAP cada año luego de iniciar la vida sexual.
- b) Una prueba de PAP 3 años luego de iniciar la vida sexual y luego cada año.
- c) Una prueba de PAP 3 años luego de iniciar la vida sexual, 3 años consecutivos negativos, entonces cada 3 años.
- d) Una prueba de PAP solo si tiene infección por HPV.
- e) Cada año si el primer PAP es positivo.

4.- ¿Cómo funcionan las vacunas contra VPH?

- a) Las vacunas contra VPH funcionan como otras inmunizaciones que protegen contra infecciones virales.
- b) Mediante estimulación de la inmunidad celular epitelial.
- c) Formando anticuerpos anti DNA viral.
- d) Cuando ya ha existido contacto con el virus, refuerza la respuesta inmunitaria.
- e) Ninguna.

5.- A qué edad se recomienda iniciar la vacunación de las niñas?

- a) Al inicio de sus relaciones sexuales
- b) 3 años después de iniciar su vida sexual
- c) Entre los 11 y 12 años
- d) A sus 21 años
- e) b y c

Respuestas Cuestionario # 51

Respuestas:

- 1. e
- 2. b
- 3. c
- 4. a
- 5. c