

DOI: <https://doi.org/10.52428/20756208.v19i46.1104>

Estudio morfológico de la lingula y la presencia de la antilingula en mandíbulas secas bolivianas

Morphological study of the lingula and the presence of the antilingula in dry bolivian jaws

 Milton Portugal Alvestegui¹  Heber Gonzalo Quelca Choque²  Christian Rubén Cusi Fernandez³
 Lizette Tiñini Gutierrez⁴

Filiación y grado académico

¹Cirujano dentista. Docente titular de Anatomía Humana y Neuroanatomía de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia. milton.ayestegui@gmail.com.

²Cirujano dentista. Especialista en Cirugía Bucomaxilofacial. Trabajo independiente. La Paz, Bolivia. hebergonzaloq@gmail.com. <https://>

³Cirujano dentista. Trabajo independiente. La Paz, Bolivia. cusifernandezchristian@gmail.com.

⁴Cirujano dentista. Trabajo independiente. La Paz, Bolivia. lizette.tinini@gmail.com.

Fuentes de financiamiento

La investigación fue realizada con recursos propios.

Conflictos de interés

Los autores declaran no tener conflicto de interés.

Recibido: 23/03/2024

Revisado: 12/04/2024

Aceptado: 16/04/2024

Citar como

Quelca Choque, H. G., Portugal Alvestegui, M., Cusi Fernandez, C. R., & Tiñini Gutierrez, L. Estudio morfológico de la lingula y la presencia de la antilingula en mandíbulas secas de adultos bolivianos. *Revista De Investigación E Información En Salud*, 19(46). <https://doi.org/10.52428/20756208.v19i46.1104>

Correspondencia

Heber Gonzalo Quelca Choque
La Paz, Bolivia.
+591 71507408
hebergonzaloq@gmail.com

RESUMEN

Introducción: La lingula y antilingula mandibular son estructuras anatómicas consideradas como puntos de referencia para técnicas de anestesia local y procedimientos quirúrgicos maxilofaciales. El presente trabajo busca estudiar la forma frecuente de la lingula y la presencia de la antilingula en piezas mandibulares secas y relacionar con otras investigaciones realizadas en otros países. **Material y métodos:** Es un estudio descriptivo transversal, realizado en 174 mandíbulas adultas secas (348 hemimandíbulas) pertenecientes a las facultades de odontología y medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz, Bolivia. **Resultados:** Se evidenció que, el 62,9 % (219) de las hemimandíbulas presentaron la forma truncada, seguida de la triangular con el 17,8 % (62 lados), siendo los tipos nodular y asimilado menos frecuentes con el 15,5% (54) y el 3,7% (13) respectivamente. Se evidenció en un 63,2 % la ausencia de la antilingula (220 hemimandíbulas) y su presencia se observó en el 36,8 % (128 lados), mostrándose simétricamente ausentes o presentes en ambos lados con el 55,2 % (96 mandíbulas) y asimétricos en 78 especímenes con el 44,8 %. **Discusión:** En las mandíbulas secas estudiadas, el tipo de lingula más común fue truncado, seguido de las formas triangular, nodular y asimilada o absorbida, siendo casi similares en cantidad entre los lados izquierdo y derecho; la antilingula está ausente en casi dos tercios de las mandíbulas bolivianas.

Palabras claves: Bolivia, mandíbula, morfología, maxilofacial.

ABSTRACT

Introduction: The mandibular lingula and antilingula are anatomical structures considered as reference points for local anesthesia techniques and maxillofacial surgical procedures. The present work seeks to study the frequent shape of the lingula and the presence of the antilingula in dry mandibular pieces and relate it to other research carried out in other countries. **Material and methods:** It is a cross-sectional descriptive study, carried out on 174 dry adult jaws (348 hemimandibles) belonging to the faculties of dentistry and medicine of the Universidad Mayor de San Andrés in the city of La Paz, Bolivia. **Results:** It was evident that 62.9% (219) of the hemimandibles presented the truncated shape, followed by the triangular shape with 17.8 % (62 sides), with the nodular and assimilated types being less frequent with 15.5 % (54) and the 3.7 % (13) respectively. The absence of the antilingula was evident in 63.2 % (220 hemimandibles) and its presence was observed in 36.8 % (128 sides), showing symmetrically absent or present on both sides with 55.2 % (96 jaws) and asymmetric in 78 specimens. with 44.8 %. **Conclusion:** In the dry mandibles studied, the most common type of lingula was truncated, followed by the triangular, nodular and assimilated or absorbed forms, being almost similar in quantity between the left and right sides. The antilingula is absent in almost two-thirds of Bolivian mandibles.

Key words: Bolivia, mandible, morphology, maxillofacial.

INTRODUCCI N

La l ngula es una proyecci n  sea de la cara medial de la rama ascendente del hueso mandibular y que toma la forma de una lengua (1) (2) (3), situ ndose por delante y superior al agujero mandibular; y posterior a este orificio se encuentra la antil ngula, una prominencia  sea de menor volumen (4) (5). Estas estructuras anatómicas son consideradas como puntos de referencia para procedimientos anestésicos locales y quir rgicos a nivel de la rama ascendente de la mand bula, su identificaci n favorece el  xito en la t cnica de anestesia del nervio dentario inferior y la realizaci n de la osteotom a sagital de la rama mandibular, procedimiento propio de la cirug a ortogn tica. Los cirujanos maxilofaciales que realizan esta cirug a para corregir anomal as esquel ticas dentofaciales mediante el avance o retroceso de este hueso, deben identificar la l ngula mandibular para realizar la osteotom a horizontal correspondiente (6) (7).

Al respecto conviene decir que, los cirujanos dentistas y con especialidad quir rgica deben estar familiarizados con las diferentes formas que presenta la l ngula mandibular, con el fin de evitar complicaciones o fracasos en las t cnicas anestésicas locales y quir rgicas de la rama mandibular (6). Al revisar la literatura sobre este tema de investigaci n, Tuli A. et al determinaron una clasificaci n de la morfolog a de la l ngula mandibular y que, muchos investigadores como Kositbowornchai et al (9), Jansisyanont et al (10), Jansisyanont et al (11) y Alves (12) basan sus estudios en esta clasificaci n hasta el d a de hoy, misma que se muestra m s adelante (8). Los tipos de l ngula mandibular observados en este trabajo se establecieron sobre la base de la clasificaci n de Tuli, las cuales corresponden a las formas: triangular, truncada, nodular y asimilada (8) (Figura 1 y 2).




Figura 1. Cuatro formas de l ngulas mandibulares. Truncada (A), triangular (B), nodular (C) y asimilada (D) (8).



Figura 2. Formas de la l ngula en mand bulas adultas secas. Truncada (A), presenta una forma triangular cortada en su v rtice. Triangular (B), con v rtice dirigido hacia el c ndilo mandibular. Nodular (C). Asimilada (D), no se evidencia la prominencia  sea lingular (8, 9).

Adem s, los datos morfol gicos de la l ngula y la antil ngula mandibular corresponden a la literatura anat mica cl sica y extranjera, siendo estudiados en la universidad. La ausencia de datos nacionales sobre la forma de la l ngula y la presencia de la antil ngula mandibular nos motiva a la b squeda de informaci n sobre estos reparos anat micos, puesto que la literatura buscada es extranjera en su totalidad. La informaci n resultante permitir  a estudiantes y profesionales del  rea odontol gica a complementar su formaci n acad mica sobre estos reparos anat micos.

Por todo lo mencionado, el principal objetivo del presente trabajo es describir los tipos de l ngula mandibular en piezas  seas secas de adultos bolivianos, adem s de conocer la frecuencia con la que se presenta la antil ngula en dichos huesos mandibulares.

MATERIAL Y M TODOS

Es un estudio descriptivo y transversal, realizado en 174 mand bulas secas de adultos bolivianos (348 l ngulas) pertenecientes a la osteoteca de la c tedra de anatom a humana de la Facultad de Odontolog a y del Departamento de Ciencias Morfol gicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andr s. El tipo de muestreo fue no probabil stico por conveniencia.

Para este estudio se determinaron los siguientes criterios de inclusi n:

- Mand bulas secas adultas
- Mand bulas secas  ntegras

Criterios de exclusi n:

- Mand bulas secas pedi tricas
- Mand bulas secas en mal estado de conservaci n, afect ndose principalmente la cara medial de las ramas ascendentes.

Durante el estudio se organizaron a las mand bulas en cuatro grupos, de acuerdo a la forma de sus l ngulas y en base a la clasificaci n de Tuli, seguidamente se compar  el tipo de l ngula de ambas ramas de cada mand bula; finalmente se determin  la presencia y ausencia de la antil ngula de las mand bulas estudiadas. El instrumento utilizado para la recolecci n de datos en la investigaci n fue la ficha de registro de la informaci n elaborada por los autores. Dichos datos obtenidos fueron registrados y analizados en el paquete de Excel 2016.

RESULTADOS

En el presente trabajo se obtuvieron los siguientes resultados, de 174 mand bulas secas, la forma de l ngula m s frecuente observada fue la truncada en 219 lados, (62,9 %), seguida de la triangular en 62 lados (17,8 %); en 54 hemimand bulas estaba presente una l ngula nodular (15,5 %) y asimilada o absorbida se observ  en 13 lados con el 3,7 % (Tabla 1).

Tabla 1. Forma frecuente de la l ngula mandibular

Forma	Cantidad	Porcentaje
Truncada	219	62,9 %
Triangular	62	17,8 %
Nodular	54	15,5 %
Absorbida	13	3,8 %
Total	348	100 %

En relaci n al lado, no se evidenci  diferencias importantes, observ ndose de forma truncada en 110 (63,2 %) hemimand bulas derechas y 109 (62,6 %) en el lado izquierdo, 32 l ngulas derechas y 30 izquierdas presentaron la forma triangular, 26 (14,

9 %) lados derechos y 28 (16,1 %) lados izquierdos mostraron el tipo nodular. La forma asimilada se comprob  en un 3,4 % (6) en el lado derecho y 4 % (7) en el izquierdo (Tabla 2).

Tabla 2. Forma de la llingua mandibular de acuerdo al lado

Forma	Derecha	Derecha	Izquierda	Izquierda
Truncada	110	63,2 %	109	62,7 %
Triangular	32	18,4 %	30	17,2 %
Nodular	26	14,9 %	28	16,1 %
Asimilada	6	3,5 %	7	4,0 %
Total	174	100 %	174	100 %

En cuanto a la presencia de la antilingula mandibular, 128 hemimandibulas (36,8 %) presentaron una pequeña prominencia ósea con formas muy variables; sin embargo, en 220 lados (63,2 %) no se identificó una antilingula (Tabla 3). En tanto que,

en el lado derecho se observó con mayor frecuencia la ausencia de la antilingula mandibular (112 hemimandibulas) y más frecuente su presencia en el lado izquierdo (66 hemimandibulas), 64,4 % y 37,9 % respectivamente (Tabla 4).

Tabla 3. Frecuencia de la antilingula mandibular

Presencia	Cantidad	Porcentaje
Presente	128	36,8 %
Ausente	220	63,2 %
Total	348	100 %

Tabla 4. – Frecuencia de la antilingula mandibular según el lado

Lado	Derecho	Porcentaje	Izquierdo	Porcentaje
Presente	62	35,6 %	66	37,9 %
Ausente	112	64,4 %	108	62,1 %
Total	174	100 %	174	100 %

En nuestros especímenes, la mayoría de las mandibulas secas (55,2 %) exponían la presencia o ausencia de la antilingula de manera simétrica

en ambos lados, en contraste del resto (44,8 %) mostraba asimetría (Tabla 5).

Tabla 5. Presentación simétrica de la antilingula mandibular

Lados	Cantidad	Porcentaje
Simetría	96	55,2 %
Asimetría	78	44,8 %
Total	174	100 %

DISCUSI N

En procedimientos quir rgicos de la rama mandibular (cirug a ortogn tica), como la osteotom a sagital para corregir deformidades dentomandibulares (5), se requiere el conocimiento de la morfolog a de la l ngula mandibular, por lo que su presencia y forma truncada no debe sorprender al cirujano oral y maxilofacial, as  como el tipo asimilado que puede llegar a encontrarse en menor porcentaje en este trabajo como en la mayor a de los estudios revisados. Estudios tailandeses muestran similitud con trabajos realizados en Sudam rica, donde la forma truncada es mayormente observada en mand bulas secas de adultos (7) (8). Los resultados encontrados se relacionan a las investigaciones

realizadas en Asia y Sudam rica, siendo Brasil, el  nico pa s vecino con dos trabajos que siguen la tipificaci n de Tuli A. et al (12) (14).

En el 2000, Tuli A. et al clasific  por primera vez la forma de la l ngula mandibular, estudiando mand bulas secas adultas en India, mostrando en los resultados que la forma triangular de la l ngula es m s frecuente evidenciar, seguida del tipo truncado, nodular y asimilado (5-8). En contraste a nuestra investigaci n, donde la forma m s observada es la truncada, siendo de la misma forma en los estudios realizados por Alves y Deana en Brasil (10); sin embargo, la forma nodular es el segundo tipo m s frecuente observado en estas mand bulas secas adultas brasile as.

Tabla 6. Estudios de la morfolog a de la l ngula en mand bulas secas

Autor, pa�s y a�o	Material	Edad en a�os	Cantidad	Lados	Formas de l�ngula	Cantidad total	Porcentaje
Tuli et al. India, 2000 (8)	Mand�bulas adultas secas	Adultos	165	330	Truncada	52	15,8 %
					Triangular	226	68,5 %
					Nodular	36	10,9 %
					Asimilada	16	4,8 %
Kositbowornchai et al. Tailandia, 2007 (9)	Mand�bulas adultas secas	27-87	72	144	Truncada	68	47,2 %
					Triangular	24	16,7 %
					Nodular	33	22,9 %
					Asimilada	19	13,2 %
Jansisyanont et al. Tailandia, 2009 (10)	Mand�bulas adultas secas	18-83	92	184	Truncada	85	46,2 %
					Triangular	55	29,9 %
					Nodular	36	19,6 %
					Asimilada	8	4,3 %
Murlimanju et al. India, 2012 (11)	Mand�bulas adultas secas	Adultos	67	134	Truncada	37	27,6 %
					Triangular	40	29,9 %
					Nodular	40	29,9 %
					Asimilada	17	12,7 %
Alves y Deana. Brasil, 2016 (12)	Mand�bulas adultas secas	Adultos	132	253	Truncada	124	49,0%
					Triangular	59	23,3 %
					Nodular	67	26,5 %
					Asimilada	3	1,2 %
Asdullah et al. India, 2018 (13)	Mand�bulas adultas secas	Adultos	50	100	Truncada	32	32,0 %
					Triangular	42	42,0 %
					Nodular	20	20,0 %
					Asimilada	6	6,0 %

Las limitaciones de este estudio fueron que, únicamente se tomó en cuenta una clasificación de la forma de la llingula mandibular (Tabla 6), basado en un trabajo plenamente descriptivo. En suma, se establece en nuestro estudio que, la forma de llingula mandibular con más frecuencia observada es la truncada, seguida de la triangular, nodular y asimilada, esta última en menor porcentaje, coincidiendo con todas las investigaciones revisadas (Tabla 6). Además, nuestros datos se relacionan de manera importante con los resultados

encontrados en Tailandia (9) (10) y Brasil (12) (14), contrastando con los hallados por Tuli A. et al y otros investigadores de la India. Por lo tanto, se sugiere realizar más investigaciones para establecer la relación de la forma de la llingula mandibular con las etnias. Finalmente, aproximadamente dos tercios de las mandíbulas estudiadas no presentan antilingula, dato que debe ser considerado por los cirujanos maxilofaciales que realizan la cirugía ortognática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Moore KL, Dalley AF, Agur AM. Anatomía de orientación clínica. 8ª ed. Barcelona: Wolters Kluwer; 2017.
2. Rouviere H, Delmas A. Anatomía Humana descriptiva, topográfica y funcional. 11ª ed. Barcelona: Masson; 2005.
3. Testud L, Jacob O. Anatomía Topográfica. 8ª ed. Barcelona: Salvat; 1927.
4. Sobotta J. Atlas de Anatomía Humana. 21º ed. Madrid: Panamericana; 2002.
5. Figun M, Garino R. Anatomía odontológica funcional y aplicada. 3º ed. Buenos Aires: El Ateneo; 2020.
6. He P, Iwanaga J, Matsushita Y, Adeeb N, Topale N, Tubbs RS, et al. A Una revisión comparativa de las cirugías ortognáticas mandibulares con el enfoque en la osteotomía intraoral vertico-sagital de la rama [Internet]. 2017; 9 (12). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32760640/>
7. Nayaran R, Ghosh S. Análisis morfológico del foramen mandibular a través de los planos anatómicos: implicaciones para el bloqueo del nervio alveolar inferior. Anat Sci Int. 2020; 95 (2): 209-218. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12565-019-00511-4>
8. Tuli A, Choudhry R, Choudhry S, Raheja S, Agarwal S. Variación de la forma anatómica de la llingula en mandíbulas adultas. J Anat. 2000; 197: 313-7. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1468130/>
9. Kositbowornchai S, Siritapetawee M, Damrongrungruang T, Khongkankong W, Chatrchaiwiwatana S, Khamanarong K, et al. Forma de la llingula y su localización por radiografía panorámica vs medición en mandíbulas secas. Surg Radiol Anat. 2007;29(8): 689-694. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00276-007-0270-9>
10. Jansisyanont P, Apinhasmit W, Chompoopong S. Forma, altura y ubicación de la llingula para la osteotomía sagital de la rama en Tailandia. Clin Anat. 2009;22(7). Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ca.20849>
11. Murlimanju BV, Prabhu LV, Pai MM, Paul MT, Saralaya VV, Kumar CG. Estudio morfológico de la llingula de las mandíbulas en la población del sur de la India. Morphologie. 2012; 96 (312): 16-20. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1286011512000021?via%3Dihub>

12. Alves N, Deana NF. Morphological study of the lingula in adult human mandibles of Brazilians individuals and clinical implications. Biomed Res Int; 2015: 1-7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25821826/>
13. Asdullah M, Ansari AA, Khan MH, Salati NA, Khawja KJ, Sachdev AS. Variaciones morfol gicas de la l ngula y prevalencia de agujeros mandibulares accesorios: un estudio. Cirug a Natl J Maxillofac. 2018; 9 (2): 129-133. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6251292/>
14. Lima F, Oliveira F, Barbosa F, Sousa C. Ubicaci n, forma y relaciones anat micas del foramen y l ngula mandibular: una contribuci n a los procedimientos quir rgicos en la rama mandibular. Oral Maxillofac Surg. 2016; 20: 177-182. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10006-016-0547-4>