

## GRADO DE CONOCIMIENTO DEL ANTIBIÓTICO PRESCRITO EN PACIENTES AMBULATORIOS

Elena Bernabé Muñoz, Macarena Flores Doradob, y Fernando Martínez Martínez. Aten Primaria. 2015;47(4):228-235

**Introducción:** El escaso conocimiento de los pacientes sobre sus medicamentos es considerado una de las principales causas de su uso inadecuado.

**Objetivo:** El presente estudio mide el grado de conocimiento de los pacientes sobre el antibiótico prescrito y describe algunos de los factores asociados al mismo.

**Diseño:** Estudio observacional descriptivo transversal con componente analítico.

**Emplazamiento:** Se realizó en una farmacia comunitaria de Murcia.

**Método:** El estudio se ofertó a todos los pacientes que acudían a la farmacia a retirar un antibiótico durante el periodo de estudio. El instrumento usado para determinar el grado de conocimiento fue un cuestionario validado.

**Resultados:** Se incluyeron 126 pacientes, la mayoría eran mujeres (67,5%), con una media de edad de 44,6 años (DE: 17,9, mín. 41,5, máx. 47,8).

La mitad de la población de estudio, 53,2% (IC 95%, 44,06-62,28) no tenía un conocimiento que le permitiera asegurar un correcto proceso de uso del antibiótico que utilizaba. El «proceso de uso» del medicamento fue la dimensión más conocida por la población, seguida del «objetivo terapéutico». La dimensión relacionada con la «seguridad» del medicamento fue la que obtuvo valores más bajos. Tras la regresión logística, se encontró asociación entre el conocimiento del antibiótico y las variables «conoce nombre del antibiótico» ( $p = 0,05$ ;  $r = 2,15$ ) y «número de medicamentos que toma el paciente» ( $p = 0,02$ ;  $r = 0,30$ ).

**Conclusiones:** Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que existen ciertas carencias de información respecto al uso de antibióticos en la muestra estudiada. Estos resultados podrían permitir orientar futuras intervenciones, dirigidas a cubrir las necesidades de información concretas detectadas.

## ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA: PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS

Betlem Salvador González, Mercedes Rodríguez Pascual, Laura Ruipérez Guijarro, Antonia Ferré González, Oriol Cunillera Puertolas y Luisa M. Rodríguez Latre. Aten Primaria. 2015;47(4):236-245

**Introducción:** La ERC es una enfermedad muy prevalente, especialmente en los individuos de mayor edad.

**Objetivo:** Conocer la prevalencia y los estadios de la enfermedad renal crónica según la estimación del filtrado glomerular (eFG), y los factores de riesgo asociados en individuos  $\geq 60$  años.

**Diseño:** Estudio observacional transversal.

**Emplazamiento:** Atención Primaria.

**Participantes:** Sujetos  $\geq 60$  años de 40 centros de Atención Primaria con determinación de creatinina sérica entre 1 enero-31 diciembre de 2010. Criterios de exclusión: trasplante renal, atención domiciliaria.