

CRISIS, FUNCIONALIDAD Y TIPOLOGÍA FAMILIAR EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA.

Soto-Araujo, P., Salazar-Orozco, F., Ramírez-Leyva, D. H., Valle-Irube, C., Medina-Serrano, J. M., & Flores-Lujano, J. *Atención Familiar*. 2022; 30(1): 9-14. <https://doi.org/10.22201/fm.14058871p.2023.1.83855>

Objetivo: describir la crisis, funcionalidad y tipología familiar en pacientes con cáncer de mama.

Métodos: estudio transversal analítico, se realizó entre agosto y diciembre de 2021. La muestra fue de 250 pacientes

con cáncer de mama que cumplieron los criterios de selección. La presencia de crisis familiares se determinó con el test de Holmes-Rahe. La funcionalidad familiar se valoró con la Escala de Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión

Familiar III. La tipología familiar se determinó con base en su conformación. Realizamos estadística descriptiva e inferencial. Para el análisis bivariado se utilizó razón de momios, χ^2 de Pearson y U de Mann-Whitney con intervalos de confianza de 95% ($p < 0.05$).

Resultados: la frecuencia de crisis en pacientes con cáncer de mama fue de 89% (enfermedad personal, cambios

en los hábitos de sueño, alimentación y condiciones familiares), las familias disfuncionales se presentaron en 58% y la tipología familiar más frecuente fue nuclear (63%).

Conclusión: un alto porcentaje de pacientes con cáncer de mama tienen crisis familiares, las cuales se generaron durante el proceso de la enfermedad.